

## **BADANIE ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO**

1. Polega na wsunięciu instrumentu optycznego (endoskopu) do badanej części przewodu pokarmowego (żołądek, dwunastnica). Badanie wykonuje się w celu dokładnego obejrzenia i określenia istniejących zmian chorobowych. Podczas badania istnieje możliwość pobrania wycinków z uwidocznionych w trakcie badania zmian chorobowych.
2. Badanie jest przeprowadzone w pozycji leżącej po miejscowym znieczuleniu gardła. Polega ono na założeniu przez jamę ustną i gardło fibroskopu o śr. ok. 1 cm do przełyku a następnie żołądka i dwunastnicy, co pozwala na oglądanie wnętrza przewodu pokarmowego. Badanie trwa kilka minut.
3. **Możliwe powikłania:**  
Powikłania zdarzają się niezmiernie rzadko, jednak powodzenia i absolutnego bezpieczeństwa tego badania nie jest w stanie zagwarantować żaden lekarz. Wyjątkowo zdarzyć się może przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego lub krwawienie wymagające pilnego leczenia operacyjnego. Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych narządów w postaci zaostrzenia istniejących chorób serca, płuc lub neurologicznych.

### **4. ANKIETA DLA PACJENTA**

**Aby ograniczyć do minimum niebezpieczeństwo powikłań związane z podawaniem środków znieczulających – prosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie:**

- a. **Czy istnieje u Pani/Pana zwiększona skłonność do krwawienia, zwłaszcza po drobnych skaleczeniach, po usunięciu zębów, bądź do powstawania sińców po niewielkich urazach mechanicznych?**  
 TAK\*                       NIE\*
- b. **Czy podobne objawy występowały wśród członków Pana/Pani rodziny?**  
 TAK\*                       NIE\*
- c. **Czy przyjmuje Pan/Pani leki powodujące „rozrzedzanie” krwi (np. Syncumar, Sintrom, Aspiryna)?**  
 TAK\*                       NIE\*
- d. **Czy rozpoznano u Pana/Pani jakieś schorzenia serca, układu krążenia lub płuc (np. schorzenie zastawek serca, wysokie ciśnienie krwi, choroba wieńcowa czy astma oskrzelowa)?**  
 TAK\*                       NIE\*

Na około sześć godzin przed badaniem gastroscopowym nie należy nic jeść, a na ostatni napój możemy wypić cztery godziny przed zabiegiem. Jeżeli przyjmujesz stale leki, połknij je rano niewielką ilością wody. Na kilka godzin przed gastroskopią nie należy palić papierosów, ani żuć gumy!

**Uwaga! Pacjenci, którzy stosują leki zmniejszające krzepliwość krwi, powinni przed badaniem je odstawić lub zmienić na inne. Należy to zrobić po konsultacji z lekarzem.**

**Przewlekłe stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej może dawać fałszywie ujemny wynik testu ureazowego. Zaleca się odstawienie leku około 10-14 dni przed badaniem, jednak taka decyzja należy do lekarza. Ale jak najbardziej dopuszczalne jest wykonanie gastrokopii podczas terapii.**

**Również po zabiegu nie zaleca się spożywania niczego przynajmniej przed dwie godziny, ponieważ podrażnione gardło i przełyk mogą wywoływać silne uczucie bólu.**