

SPIROMETRIA

Przygotowanie do badania

- Przed badaniem nie należy palić papierosów ani pić alkoholu (min. 4 godziny, a najlepiej 24 godziny).
- Nie należy zakładać ubrania krępującego ruchy w zakresie tułowia (klatki piersiowej i brzucha).
- Przez 2 godziny przed badaniem nie należy jeść obfitych posiłków.
- Bezpośrednio przed badaniem (około 30 minut) nie należy podejmować intensywnego wysiłku fizycznego.
- Konieczne może być odstawienie przed badaniem niektórych leków na astmę (tylko wtedy, gdy spirometria będzie wykonywana po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela); podczas rejestracji/ustalania terminu badania chory zostanie zapewne poinformowany o konieczności odstawienia przed badaniem leków rozkurczających oskrzela (jeśli wykonywana będzie próba odwracalności obturacji).

Przeciwwskazania do badania

- Niekontrolowane i znaczne nadciśnienie tętnicze
- Krwioplucie nieznanego pochodzenia
- Niedawno przebyty zawał serca lub niestabilna dławica piersiowa
- Niedawno przebyte krwawienie wewnątrzczaszkowe lub operacja głowy
- Tętniaki aorty albo tętnic mózgowych
- Niedawno przebyta operacja na naczyniach krwionośnych
- Przebyta niedawno operacja okulistyczna lub przebyte odwarstwienie siatkówki