

## **Przygotowanie do biopsji**

Przygotowanie do biopsji cienkoigłowej należy rozpocząć na tydzień przed planowanym zabiegiem. Należy wówczas (w porozumieniu z lekarzem) odstawić środki zawierające w składzie kwas acetylosalicylowy i leki przeciwbólowe zawierające ibuprofen czy naproksen. Należy także poinformować lekarza o przyjmowanych lekach przeciwzakrzepowych oraz o wszystkich innych preparatach przyjmowanych stale. Na kilka godzin przed biopsją cienkoigłową nie powinno się przyjmować napojów i pokarmów.

Na badanie BAC pacjent zgłasza się ze skierowaniem lub wynikami badania USG. Po biopsji zaleca się powstrzymanie od forsującej aktywności fizycznej (przez dobę) oraz rezygnację z zażywania preparatów ze wspomnianym kwasem acetylosalicylowym (przez dwie doby). Przeciwbólowo dopuszczalny jest paracetamol, chociaż ból po biopsji cienkoigłowej nie jest zazwyczaj na tyle silny, by konieczne było przyjmowanie jakichkolwiek środków.

## **Jak wygląda biopsja BAC**

Biopsję aspiracyjną cienkoigłową wykonuje się cienką igłą o średnicy zewnętrznej 0,5–0,6mm, dlatego przeważnie nie znieczula się miejsca, w którym będzie wykonywany zabieg. W czasie badania można odczuwać lekki dyskomfort. Przeprowadza się natomiast dokładne odkażenie miejsca, w którym będzie wykonane wkłucie. Przebieg biopsji cienkoigłowej zależy od stopnia wyczuwalności zmiany. W Centrum Zdrowia Darimed pacjenci mają zagwarantowany wynik tego samego dnia bez dodatkowych opłat.